

## HELICOBACTER PYLORI – TEST RESPIRATOIRE

### PRINCIPAUX MEDICAMENTS PROSCRITS

- Antibiotiques : à arrêter au **minimum 4 semaines** avant le test.
- Anti-sécrétoires type IPP ou anti-H2 : à arrêter **au minimum 2 semaines** avant le test.
- Anti-acides et pansements gastro-intestinaux : à arrêter **au minimum 24 heures** avant le test.

Antiacides et pansements gastro-intestinaux (24 heures avant le test)	Inhibiteurs de la pompe à protons (2 semaines avant le test)	Anti-H <sub>2</sub>	Également
Acridine, Actapulgate, Bedelix, Bolinan, Gastropax, Kaomuth, Maalox, Marga, Moxycdar, Neutroses, Pepsane, Phosphalugel, Polysilane, Rennie, Riopan, Rocgel, Siligaz, Smecta, Xolaam.	Omeprazole : Mopral®, Zoltum® Esomeprazole : Inexium® Pantoprazole : Inipomp®, Eupantol® Rabeprazole : Pariet® Lansoprazole : Lanzor®, Ogast®.	Stomedine, Tagamet, Pepcidac, Pepdine, Nizaxid, Azantac, Raniplex, Pepcidduo, Cimétidine, Ranitidine.	Cytotec, Keal, Ulcar