

## GESTION DES INCIDENTS DE PRELEVEMENT

| Incidents ou Accidents                           | Causes  | Conduite à tenir  |
|--|---|---|
| Malaise du patient qui reste cependant conscient | Anxiété, jeûne, ...                               | <p>Rassurer le patient.</p> <p>Arrêter le prélèvement et faire comprimer par le patient le point de prélèvement.</p> <p>Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu'il soit le plus allongé possible</p> <p>Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire</p> <p>Eviter la perte de connaissance en retenant l'attention du patient</p> <p>Prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de l'AFGSU sans laisser le patient seul.</p> <p>Noter l'incident sur la fiche de prélèvement</p> |
| Hématome au point de prélèvement                 | Garrot trop serré, trop fine, piqûre hésitante... | <p>Rassurer le patient.</p> <p>Compresser le point de prélèvement</p>   |
| Perte de connaissance du patient                 | Anxiété, jeûne + causes médicales                 | <p>Arrêter le prélèvement,</p> <p>Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce</p>   |

| Incidents ou Accidents | Causes | Conduite à tenir   |
|------------------------|--------|--|
|                        |        | <p>qu'il soit le plus allongé possible</p> <p>Relever les jambes du patient de manière à ce qu'elles soient plus hautes que la tête et le couvrir si nécessaire</p> <p>Prévenir le 15 ou un médecin rapidement disponible.</p> <p>Remarque : en cas de crise d'épilepsie prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que le patient ne se blesse.</p> <p>Noter l'incident sur la fiche de prélèvement</p> |